

MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN ÇOCUKLARINDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU SEMPTOM SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

¹Ece Çalışkan, ¹Duygu Kılıç, ²Serdar Nurmedov, ²Onur C. Noyan, ¹Nesrin Dilbaz

¹Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul
²Niğde Hastanesi Bağımlılık Birimi, İstanbul

AMAÇ

Madde Kullanım Bozukluğu (MKB) çağımızın önemli sorunlarının başında gelmektedir. Madde kullanımı kişilerde birçok psikolojik soruna ve ruhsal hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. MKB, aile bireylerini olumsuz yönde etkileyerek bu ailelerin çocuklarında psikopatolojik sorunlara yol açabilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve birlikte gelen diğer bozuklukların ve ailelerdeki madde kullanımının yaygınlık oranı ile ilgili yapılan araştırmalar yeterli olmadığı görülmektedir. Bu araştırmada, MKB olan ebeveynlerin çocuklarında DEHB görülme oranının sağlıklı ailelerin çocuklarında DEHB görülme oranı ile karşılaştırılmasını amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ebeveynlerin sahip oldukları MKB ilgili elde edilen bilgiler ışığında ebeveyn MKB ile DEHB olan çocuk arasındaki bağlantının netlik kazanması beklenmektedir.

YÖNTEM

Katılımcılar, Kişisel Bilgi Formu, Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) ve Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY-T) ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmada, MKB olan 31 erkek hastanın 50 çocuğu ve 44 sağlıklı erkek kontrolün 50 çocuğu olmak üzere toplam 100 çocuk değerlendirmeye alınmıştır. MKB olan babaların çocuklarının ÇDDÖ Dikkat alt ölçeğinden aldıkları puanlar ($\bar{X}=41,52$) kontrol grubundaki çocukların alt ölçekten aldıkları puanlardan ($\bar{X}=35,68$) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Babası MKB tanısı almış çocukların %54'ünün ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan klinik görüşme sonucu DEHB tanısına işaret etmekteyken, kontrol grubundaki çocukların %14'ünün ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan klinik görüşme sonucu DEHB tanısına işaret etmektedir ve aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur [$\chi^2(1)=17,825$; $p<0,05$].

SONUÇ

Çalışmanın sonucunda, MKB olan babaların çocuklarında sosyal içe dönüklük, anksiyete ve depresyon bulgularının ve dışa yönelim, suç davranışları ve saldırgan davranış sergileme, sosyal sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğu, daha sık dikkat sorunu yaşandığı ve DEHB semptom sıklığının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Madde Kullanım Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Madde Kullanım Bozukluğu olan bireylerin çocukları

Journal of Dependence

bağımlılık

Dergisi

CİLT / VOLUME: 16 - EK SAYI / SUPPLEMENT

2015

9. ULUSAL ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ

POSTER BİLDİRİ KİTABI

10-12 Aralık 2015

Balkan Kongre Merkezi, Edirne

www.bagimlilikdergisi.net